

Новые оценки возраста самых старых шаровых скоплений Галактики


Г.А.Гончаров, , С.С.Савченко, А.А.Марчук, О.С.Рютина,
М.Ю.Ховричев, В.Б.Ильин, А.В.Мосенков, Д.М.Поляков,
А.А.Смирнов

Участвующие организации:

1. Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской Академии наук, Российская Федерация, 196140, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 65/1
2. Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
3. Department of Physics and Astronomy, N283 ESC, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA
4. Санкт-Петербургский государственный университет Аэрокосмического приборостроения, Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская улица 67А
5. Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук, Российская Федерация, 369167, Нижний Архыз

Выполнено по гранту РНФ 20-72-10052.

Шаровое скопление NGC5272 (Messier 3, M3) на снимке телескопа Hubble.



В нашей Галактике открыто примерно 170 шаровых скоплений (ШС).

Типичное ШС: >100 тысяч звёзд массой <0.8 масс Солнца
и возрастом >10 млрд лет.

Но только ~50 "плодотворных" ШС.



Космический телескоп WISE:
инфракрасная фотометрия

Мы использовали:
Наземный
телескоп
SkyMapper:
фотометрия




Наземный телескоп
Pan-STARRS:
фотометрия

и другие телескопы

Наземный телескоп VISTA:
фотометрия






Космический телескоп Gaia **недавно**
получил фотометрию, параллаксы и собственные движения звёзд
скоплений:

Gaia Data Release 3 (DR3) - Vallenari A. et al., **2023**, A&A, 674, A1,
что позволило достоверно отобрать члены скоплений.

Hubble Space Telescope

недавно получил фотометрию во
множестве фильтров, параллаксы и
собственные движения звёзд скоплений:
Nardiello D. et al., 2018, MNRAS, 481, 3382
Simioni M. et al., 2018, MNRAS, 476, 271
Libralato M. et al., 2022, ApJ, 934, 150



Используемые нами [лучшие?] теоретические модели внутреннего строения и эволюции звёзд:

Bag of Stellar Tracks and Isochrones (**BaSTI**)

<http://basti-iac.oa-abruzzo.inaf.it/>

Pietrinferni et al., 2021, ApJ, 908, 102

Princeton-Goddard-PUC (**PGPUC**)

<http://www2.astro.puc.cl/pgpuc/>

Valcarce et al., 2012, A&A, 547, 5

Victoria-Regina models (**VR**)

<https://www.canfar.net/storage/list/VR>

VandenBerg et al., 2014, ApJ, 794, 72

Dartmouth Stellar Evolution Database

(**DSED**)

<http://stellar.dartmouth.edu/models/>

Dotter et al., 2008, ApJS, 178, 89

Учтены:

обогащение альфа-элементами

гелиевая вспышка

стохастическая потеря массы

конвективное перемешивание

диффузия


вращение звёзд


...

= кажется, учтено всё.

Пример - скопление NGC288, $l=151^\circ$, $b=-89^\circ$, расстояние от Солнца $R \approx 9$ кпк, отбор членов с помощью параллакса и собственных движений Gaia DR3, фотометрия Stetson+2024 с $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.2$, $[\alpha/\text{Fe}] = +0.4$, $E(B-V) \approx 0$ даёт

лучшее решение:







<- Лучшее решение

Что меняется с возрастом?


Лучшее решение для
возраста 12.5 Gyr




Лучшие решения



Лучшие решения



Лучшие решения



Для каждого скопления использованы, как минимум, три набора данных (HST, Gaia и Stetson+2024) с фотометрией в 13 фильтрах. Всего проанализировано >1000 независимых диаграмм "цвет-звёздная величина", из них >500 для фильтров в оптическом диапазоне. По каждой диаграмме получена независимая оценка возраста.

Поэтому итоговая статистическая неопределённость измеренного возраста всегда лучше 200 миллионов лет и, таким образом, пренебрежимо мала по сравнению с систематической неопределённостью из-за использования той или иной модели.

Некоторые старые галактические шаровые скопления из 41 скопления, рассмотренного нами (>21%).

<<< Возраст (млрд. лет) >>>

	Доля гелия	BaSTI	PGPUC	VR	Среднее и погрешность	
NGC288	$Y > 0.28$	13.5	14	14.5	14.0	± 0.5
NGC5024	$Y \sim 0.26$	13	13.5	14	13.5	± 0.5
NGC6205	$Y \sim 0.28$	13.5	14	14.5	14.0	± 0.5
NGC6218	$Y \sim 0.27$	14	14	15	14.33	± 0.5
NGC6254	$Y > 0.28$	13.5	14	14.5	14.0	± 0.5
NGC6341	$Y = 0.25$	13.5	14.5	14.5	14.17	± 0.5
NGC6541	$Y \sim 0.26$	13.5	14.5	14.5	14.17	± 0.5
NGC6752	$Y \sim 0.26$	14	14.5	15	14.5	± 0.5
NGC7099	$Y \sim 0.26$	13	14	14	13.67	± 0.5

Итак: Возраст >13 Gyr (или даже 13.5 ?) значит обычное звездообразование и солнечное содержание гелия всего лишь через 500 (или даже 100 ?) миллионов лет после Большого Взрыва!

Вывод:

Сопоставление недавних астрометрических и фотометрических наблюдений HST, Gaia, Pan-STARRS, SDSS, SMSS, VISTA, WISE и других с теоретическими моделями внутреннего строения и эволюции звёзд DSED, BaSTI, PGPUC и Victoria-Regina даёт возраст некоторых шаровых скоплений нашей Галактики >13 (или даже 13.5 ?) миллиардов лет при высоком обогащении гелием и альфа-элементами.

Наши статьи о шаровых скоплениях:

1. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2019, 483, 4949-4967
2. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2020, 497, 3674-3693
3. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2021, 508, 2688-2705
4. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2023, 518, 3036-3054
5. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2023, 526, 5628-5647
6. Gontcharov et al., Research in Astronomy and Astrophysics, 2024, 24, 065014

Большой Взрыв не является рождением времени и пространства?

Есть ли способ передать материю и объекты типа шаровых скоплений сквозь Большой взрыв?

Например:

Большой Взрыв - рождение чёрной дыры, которая в дальнейшем поглощая окружающие объекты, к нашему времени приобрела массу $\sim 10^{23}$ масс Солнца (гипермассивная) и, соответственно, радиус ~ 14 миллиардов световых лет, то есть является видимой частью Вселенной, обособленной от остальной Вселенной.

Внутри такой дыры, вдали от её центра плотность материи, температура, приливные силы и другие характеристики привычны для нас.

Выводы:

1. Сопоставление недавних наблюдений HST, Gaia и других с теоретическими моделями внутреннего строения и эволюции звёзд DSED, BaSTI, PGPUC и Victoria-Regina даёт возраст некоторых шаровых скоплений нашей Галактики >13 миллиардов лет при высоком обогащении гелием и альфа-элементами.
2. Возможно, химия и физика Вселенной как в наше время, так и сразу после Большого взрыва определяется не только самим Большим взрывом, но и событиями до него. Одна из гипотез передачи объектов из пространства и времени до Большого взрыва в наше пространство и время: Большой взрыв есть рождение гипермассивной чёрной дыры (современной массой $\sim 10^{23}$ масс Солнца и радиусом Шварцшильда ~ 14 миллиардов световых лет), которую мы воспринимаем как видимую часть Вселенной и внутри которой уже после её рождения попали многие объекты, включая галактики и шаровые скопления.

Наши статьи о шаровых скоплениях:

1. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2019, 483, 4949-4967
2. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2020, 497, 3674-3693
3. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2021, 508, 2688-2705
4. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2023, 518, 3036-3054
5. Gontcharov et al., Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 2023, 526, 5628-5647
6. Gontcharov et al., Research in Astronomy and Astrophysics, 2024, 24, 065014

Выполнено при поддержке гранта РНФ 20-72-10052.


Спасибо за внимание!

georgegontcharov@yahoo.com

17

Старая история -
возраст шаровых скоплений против возраста Вселенной.

Клиффорд Саймак
"Заповедник гоблинов"
1968 год



00 47 7.458 -71 47 22.40

simbad


NGC 362

Шаровые скопления проецируются на край
Малого Магелланова облака


NGC 104

FoV: 5.16°


Aladin




Использование собственных движений звёзд из **Gaia Data Release 3 (DR3)** вблизи NGC362 для их уверенного разделения на собственно звёзды NGC362 и звёзды Малого Магелланова облака (SMC).



Исходная диаграмма "цвет-
величина" для NGC 6397 по
фотометрии Gaia, загрязнённая
звёздами карликовой галактики в
Стрельце



Отбор членов NGC 6397 по
собственным движениям Gaia
DR3 - **в красном овале**.
Большинство звёзд в поле
NGC6397 принадлежит
галактике в Стрельце.



Исходная диаграмма "цвет-величина" для NGC 6397 по фотометрии Gaia, загрязнённая звёздами карликовой галактики в Стрельце




Диаграмма "цвет-величина" по фотометрии Gaia: NGC 6397 - **красные точки**, галактика в Стрельце - чёрные точки.

Переобработка **ВСЕЙ** наземной ПЗС-фотометрии звёзд скоплений
с 1985 года:


Stetson et al., **2019**, MNRAS, 485, 3042

+ переобработка продолжается **2019-2024**:

(https://www.canfar.net/storage/vault/list/STETSON/homogeneous/Latest_photometry_for_targets_with_at_least_BVI)

The screenshot shows the CANFAR storage vault interface. The URL in the browser is www.canfar.net/storage/vault/list/STETSON/homogeneous/Latest_photometry_for_targets_with_at_least_BVI. The interface includes a search bar, navigation tabs (vault, Up, Root), and action buttons (Add, Move, Delete). A status bar indicates 200.00 GB remaining of 200.00 GB. Below this, a table lists 9 of 359 entries.

Name	Size	Last Modified (UTC)	Read/Write	Read	Owner
☐ 000README	--	2024-02-23 - 23:36:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ 133P_(BVRI)	--	2020-02-14 - 21:36:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ 4U1543_(BVRI)	--	2022-06-21 - 18:51:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ Abell35_(BVRI)	--	2020-01-09 - 00:06:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ AM1_(UBVRI)	--	2023-02-21 - 23:51:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ AM4_(UBVRI)	--	2023-05-18 - 16:06:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ AndI_(BVI)	--	2022-11-02 - 19:06:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ Anonymous11_(UBVRI)	--	2024-01-29 - 23:36:01	StetsonStandards	Public	stetson
☐ Anonymous2	--	2023-02-21 - 18:21:01	StetsonStandards	Public	stetson



Шаровое скопление NGC5272 (Messier 3, M3) на снимке телескопа Hubble.

В нашей Галактике открыто
примерно 170 шаровых
скоплений (ШС).

Типичное ШС: >100 тысяч
звёзд массой <0.8 масс Солнца
возрастом >10 млрд лет.


Многие ШС - на фоне балджа,
видны плохо.

Некоторые ШС - в гало, на
расстоянии >30 кпк.

Некоторые ШС - на фоне
Малого Магелланова облака
или Карликовой галактики в
Стрельце.

Итог: ~50 "плодотворных" ШС.


Диаграмма "цвет-величина" для фотометрии Hubble в фильтрах F606W и F814W: выделены области с I экстремально голубыми HB, II переменными RR Lyrae, III другими переменными, IV голубыми бродягами, не используемыми в фиттинге, и V тусклыми гигантами RGB с высокой долей гелия $Y > 0.25$.



- изохрона BaSTI для $Y=0.25$
- изохрона DSED для $Y=0.25$
- BaSTI ZAHB для $Y=0.25$
- BaSTI ZAHB для $Y=0.275$

Dotter et al., 2008, ApJS, 178, 89 - Dartmouth Stellar Evolution Database (DSED)

Pietrinferni et al., 2021, ApJ, 908, 102 - Bag of Stellar Tracks and Isochrones (BaSTI)




Оценки A_v _obs из литературы (неоднородные оценки) для 50 галактических шаровых скоплений с $|b| > 13^\circ$ в


сопоставлении с предсказаниями A_v _calc по нашей двумерной карте - черные символы (оценки Clementini+2022 для переменных RR Лир внутри NGC288, NGC5139 и IC4499 - красные квадраты).

Подтверждена точность наших карт $\sigma(A_v)=0.06$.

Хubble Space Telescope, прибор WFC/ACS, фильтры на 606 и 814 нм




Gaia DR3, фильтры BP и RP




NGC 6218, $l=16^\circ$, $b=+26^\circ$, расстояние от Солнца $R \approx 5.1$ кпк,
отбор членов с помощью параллакса и собственных движений Gaia DR3,
фотометрия Stetson+2024 с $[Fe/H] \approx -1.2$, $[\alpha/Fe] = +0.4$, $E(B-V) \approx 0.2$ даёт

лучшее решение:



NGC 7099, $l=27^\circ$, $b=-47^\circ$, расстояние от Солнца $R \approx 8.6$ кпк,
отбор членов с помощью параллакса и собственных движений Gaia DR3,
фотометрия Stetson+2024 с $[\text{Fe}/\text{H}] \approx -2.1$, $[\alpha/\text{Fe}] = +0.4$, $E(B-V) \approx 0.03$ даёт

лучшее решение:




NGC 6352, $l=341^\circ$, $b=-7^\circ$, расстояние от Солнца $R \approx 5.5$ кпк

Gaia DR3 BP-RP

BaSTI $[\text{Fe}/\text{H}] = -0.6$

DSED $[\text{Fe}/\text{H}] = -0.8$



Некоторые старые галактические шаровые скопления из 41 скопления, рассмотренного нами (>21%).

<<< Возраст (млрд. лет) >>>

	Доля гелия	DSED	BaSTI	PGPUC	VR	Среднее
NGC288	$Y > 0.28$	13	13.5	14	14.5	13.75 ± 0.75
NGC5024	$Y \sim 0.26$	13	13	13.5	14	13.38 ± 0.50
NGC6205	$Y \sim 0.26$	13	13.5	14	14.5	13.75 ± 0.75
NGC6218	$Y \sim 0.27$	13	14	14	15	14.00 ± 1.00
NGC6254	$Y > 0.28$	13	13.5	14	14.5	13.75 ± 0.75
NGC6341	$Y = 0.25$	13.5	13.5	14.5	15	14.13 ± 0.75
NGC6541	$Y \sim 0.26$	13.5	13.5	14.5	14.5	14.00 ± 0.50
NGC6752	$Y \sim 0.26$	13	14	14.5	15	14.13 ± 1.00
NGC7099	$Y \sim 0.26$	13.5	13	14	14.5	13.75 ± 0.75

Итак: обычное звездообразование и солнечное содержание гелия всего лишь через 500 миллионов лет после Большого Взрыва!