Фракционирование дейтерия как маркер происхождения молекул воды от ядер галактик до околосолнечной окрестности

**М. С. Кирсанова
ИНАСАН**

PHYSICAL PROCESSES
IN THE INTERSTELLAR
MEDIUM

Lyman SPITZER, Jr.
Princeton University Observatory

A Wiley-Interscience Publication
John Wiley & Sons, New York
Chichester • Brisbane • Toronto

Л. СПИТЦЕР МЛ.
**ФИЗИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
В МЕЖЗВЕЗДНОЙ
СРЕДЕ**

*Перевод с английского
под редакцией*
д-ра физ.-мат. наук Д. А. ВАРШАЛОВИЧА

МОСКВА
МИР
1981

Вода и жизнь на Земле

фото: Роскосмос

Вода обнаружена не только на Земле

P H I L O S O P H I C A L

T R A N S A C T I O N S.

XIX. *On the remarkable Appearances at the Polar Regions of the Planet Mars, the Inclination of its Axis, the Position of its Poles, and its spheroidical Figure; with a few Hints relating to its real Diameter and Atmosphere.* By William Herschel, Esq. F. R. S.

Herschel, 1784

фото: NASA

Схема энергетических уровней молекулы воды

Вода обнаружена в МЗС и дальней Вселенной

Мазерное излучение воды позволяет изучать процесс звездообразования

Vaan+, 22

Cheung+, 69

Shakhvorostova+, 20

$$V_{\text{LSR}} = -c \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0}$$

Вода в галактиках

Линии воды — надежный индикатор темпа звездообразования

- Индикаторы звездообразования в УФ, оптике, ИК: $H\alpha$, CII и др. — ненадежны
- поглощение пылью
- L_{IR} (8-1000 мкм) — наилучший вариант, т.к. все УФ и оптическое излучение переизлучается пылью
- $SFR[M_{\odot}yr^{-1}] \approx 1.47 \times 10^{-10} L_{IR}[L_{\odot}]$
Kennicutt+, 12
- получить распределение энергии в спектре трудно

$$\log L_{H_2O} = \alpha \log L_{IR} + \beta$$

Не зависит от активного ядра

Yang+, 13

Нерешенные вопросы

- **Пути образования воды в условиях МЗС.** Вода в ледяных мантиях пылинок — основной резервуар кислорода? Каков вклад газофазных реакций синтеза?
- **Содержание воды в космических объектах.** Проблема дефицита кислорода и недостаток воды в областях звездообразования.
- **Перенос воды между космическими объектами.** Как вода попадает из мантий пылинок в газ? Особенности десорбции мантий.
- **Роль комет в происхождении воды на Земле.** Наследуют ли кометы воду с периферии протозвездных облаков/дисков?

Образование воды в условиях МЗС

В газовой фазе

В газовой фазе при низкой температуре

Однако, газофазные реакции не объясняют содержание воды в дозвездных ядрах!

L1544 $1.5 \cdot 10^{-6} M_{\odot}$

В газовой фазе при $T > 250 \text{ K}$

Образование воды в условиях МЗС

На поверхности пыли

- Нет барьера активации
- Избыточная энергия реакции поглощается пылинкой

дополнительные каналы расходования кислорода на пылинках

Соотношения изотопологов H₂O/HDO/D₂O

Фракционирование дейтерия — возможность исследовать пути образования воды

газ

$$\Delta E/k = 230 \text{ K}$$

и так далее...

пыль

$$\frac{\text{HDO}}{\text{H}_2\text{O}} > \frac{\text{D}}{\text{H}}_{\text{ISM}} \quad \frac{\text{D}}{\text{H}}_{\text{ISM}} = 2 \times 10^{-5}$$

HDO в центральной молекулярной зоне

500 пк вокруг центра Галактики

10% массы молекулярного газа — в ЦМЗ

$$x_{\text{HDO}} \approx 10^{-11}, T_{\text{gas}} < 100 \text{ K}$$

$$x_{\text{HDO}} \approx (1 - 4) \times 10^{-9}, T_{\text{gas}} \geq 100 \text{ K}$$

При $\text{H}/\text{D} = 1.7 \times 10^{-6}$
газофазные реакции
дадут только $x_{\text{HDO}} \approx 10^{-10}$

Вода образовалась на пылинках и затем испарилась

HDO/H₂O в областях звездообразования

Горячее ядро и оболочка

$$\frac{D}{H}^{\text{ISM}} = 2 \times 10^{-5}$$

$$T_{\text{gas}} \leq 100 \text{ K}$$

$$n_{\text{gas}} \approx 10^4 - 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$10^{-11} \leq x_{\text{H}_2\text{O}} \leq 10^{-8}$$

СОЛНЕЧНЫЕ

	NGC1333	IRAS 16293
HDO/ H ₂ O	10⁻²/7*10⁻²	3*10⁻²/5*10⁻³

$$100 \leq T_{\text{gas}} \leq 10^4 \text{ K}$$

$$n_{\text{gas}} \geq 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$10^{-6} \leq x_{\text{H}_2\text{O}} \leq 10^{-4}$$

Прогрев облака протозвездой и испарение мантий пылинок происходит быстрее в массивных областях, чем в областях солнечных масс

МАССИВНЫЕ

	G34.26	AFGL 2591
HDO/ H ₂ O	6*10⁻⁴/1.6*10⁻³	5*10⁻⁴/(0.4-4)*10⁻³

Проблема появления воды на Земле

Снеговая линия воды в Солнечной Системе находится между орбитами Марса и Юпитера

- Снеговая линия — граница области протосолнечного диска, в которой вода могла конденсироваться в твердое вещество.
- Возможный источник воды на Земле — кометное-метеоритное вещество, привнесенное в эпоху метеоритной бомбардировки молодой Земли. Предполагается, что из этого вещества могли сформироваться океаны.

Вода в отдаленных частях протопланетных дисков

Область, где выживают молекулы из первичного вещества планетной системы

Наблюдений линий воды в дисках мало, так как линии слабые!

Оценка массы воды в протопланетных дисках

Отдельные сведения, нет систематических исследований

Herschel, одиночное зеркало

- Масса воды в диске $\sim 10^5$ масс Земного океана
- $N(\text{o-H}_2\text{O})/N(\text{p-H}_2\text{O})=0.8$
- $T_{\text{spin}} = 14$ K
- Вода в TW Hya образовалась на холодной пыли

Связь с происхождением воды на Земле

- $\text{HDO}/\text{H}_2\text{O}$ — маркер местоположения в Солнечной Системе, где образовались те или иные кометы
- $\text{HDO}/\text{H}_2\text{O}$ в углистых хондритах близко к значению в Земном океане

- Отношение $\text{HDO}/\text{H}_2\text{O}$ у тел, привнесших воду на Землю по своей природе меньше?
- Высокотемпературная химия привела к уменьшению $\text{HDO}/\text{H}_2\text{O}$?

Необходимость перехода от отдельных измерений содержания воды к статистически-значимым выборкам

- Необходимо увеличить число комет и протопланетных дисков с измеренным $\text{HDO}/\text{H}_2\text{O}$
- Полезно исследовать диски вблизи звезд разных типов, в разных физических условиях и понять от чего зависит масса воды в них

Спасибо за внимание!

HDO — линии высокого возбуждения

лед

кислород

H₂O, HDO — переходы в основное состояние

Вода в галактиках

Холодная, теплая и горячая вода

- $T_{\text{dust}}=40-70\text{K}$, $n(\text{H})=10^5-10^6\text{ cm}^{-3}$, максимум изл-я пыли в галактиках (L_{IR}) формируется этой средой, $x_{\text{H}_2\text{O}}=10^{-8}-10^{-7}$
- $T_{\text{dust}}=20-30\text{K}$, $n(\text{H})=10^4-10^5\text{ cm}^{-3}$, $x_{\text{H}_2\text{O}}=10^{-9}-10^{-8}$
- Возникает в АЯГ (Arp220, Mrk231), $x_{\text{H}_2\text{O}}=10^{-6}-10^{-5}$

Для оценки содержаний критически важно качество спектров и количество линий

ALMA

Tobin+, 23

Facchini+, 24

SOFIA

Lis+, 19

Оценка массы воды в протопланетных дисках

Отдельные сведения, нет систематических исследований

ALMA, интерферометр

- Энергии верхних уровней $\approx 200, 500$ и 2000K
- Излучение из теплых верхних слоев диска
- Масса воды как минимум 3.7 массы Земного океана внутри 17 а.е.

Сложные профили линий воды в протозвездах

W3 IRS5

10^{-4}

Chavarria+, 10

Вода в галактике на большом красном смещении

Weiss+, 13